ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU
GABINETE DO VEREADOR EZEQUIAS CARVALHO (SABÃO FILHO) – MDB
Gabinete 05: E-mail: Ezequiassabaozinho@gmail.com
Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 - Fone/Fax: (092) 3361-3000
Site/Câmara:www.ale.am.gov.br/manacapuruEmaillegislativomanaca-1948@hotmail.com.camara@manacapuru.am.leg.br/

INDICAÇÃO Nº 396/2023

AUTOR**: VEREADOR EZEQUIAS DUARTE CARVALHO (Sabão Filho)**
ASSUNTO: REQUER NA FORMA REGIMENTAL, QUE O PRESENTE EXPEDIENTE SEJA ENCAMINHADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS - **WILSON LIMA**, A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS - **DRº. ANOAR ABDUL SAMAD,** AO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU – **BETANAEL DA SILVA D' ÂNGELO, SUGERINDO**: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIAS COM COLPOSCOPIA E CAF (CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA) PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS E/OU CONIZAÇÕES COMO FORMA DE TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO UTERINO NO MUNICIPIO DE MANACAPURU.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras;

O câncer de colo do útero é o mais incidente entre o público feminino no Amazonas, com a previsão de 700 novos casos para este ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ligado ao Ministério da Saúde (MS). O câncer de colo uterino é causado por um vírus chamado HPV (o Papiloma Vírus Humano), que é adquirido sexualmente ou através do contato íntimo. Muito antes de um câncer, o HPV adoece o colo do útero causando as inflamações pré-cancerosas que são detectadas no exame preventivo. Elas são chamadas lesões de baixo grau (NIC I) e, com o passar do tempo, lesões de alto grau (NIC II, NIC III e o câncer "in situ", ou seja, bem no início). É nessa fase que a conização está indicada. Essas lesões não causam nenhum sintoma como coceira, dor, corrimento ou sangramento dificultando muitas vezes o diagnóstico precoce, já que a paciente não procura de imediato a orientação medica. Segundo o Serviço de ginecologia da FCECON a conização é o tratamento para as inflamações pré-cancerosas de alto grau. É uma pequena, simples e rápida cirurgia para a retirada dessas lesões em forma de cone, assim evitando o câncer de colo uterino e não sendo necessária a retirada do útero. A cirurgia é realizada com anestesia

local, no próprio colo uterino, ou com anestesia geral na veia. Antes da realização do procedimento de conização são solicitados exames pré-operatórios para segurança da paciente, como exame de sangue e coração; A parte do colo que for retirada na cirurgia sempre é enviada ao laboratório para análise e biópsia; A alta hospitalar será após um tempo de observação, que pode variar de (01) uma a (08) oito horas; A paciente irá para casa no mesmo dia e será acompanhada a cada 06 meses com exame preventivo e Colposcopia (com um binóculo especial para avaliar os detalhes do colo uterino) por um período, em média de 02 anos. Hoje o único centro de referência do SUS, para realização dessa pequena cirurgia e a FCECON, pelo que se faz urgente e imprescindível uma estratégia de implantação deste centro de referência no município de Manacapuru., para o combate ao câncer de colo uterino, haja vista, que as nossas mulheres continuam morrendo por uma doença evitável.

Isto posto conto com o apoio dos nobres pares para apreciação da presente matéria.

Sala das Sessões da Câmara de Manacapuru, 03 de agosto de 2023

Ezequias Duarte Carvalho

Vereador – EZEQUIAS DUARTE CARVALHO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASIELIRO MDB -15