Ementa: sugere que o Executivo Municipal, atrav? da Secretaria Municipal de Sa?e e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente elabore uma pesquisa em nosso munic?io a fim de detectar a extens? da preocupante prolifera?o do caramujo-africano.

Senhor Presidente,

Requer seja, ap? delibera?o regimental do Plen?io, encaminhada c?ia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize aos setores competentes desta Municipalidade para que realizem uma pesquisa no Munic?io, a fim de detectar o est?io de prolifera?o do caramujo-africano que tem se tornado vis?el e preocupante em alguns bairros da sede, e possivelmente, no interior do munic?io, sendo um problema n? s?de Sa?e P?lica como pode afetar o equil?rio ecol?ico do meio-ambiente infestado.

O caramujo-africano ?um molusco terrestre pertencente ?esp?ie Achatina fulica nativo das regi?s leste e nordeste da ?rica. Chegou ao Brasil, em 1988, a id?a inicial seria comercializ?lo a um pre? inferior ao escargot. Importado ilegalmente, foi introduzido em fazendas no interior do Paran?e escapou para o meio ambiente, adaptando-se perfeitamente em v?ias regi?s brasileiras. Desde ent?, passou a ser chamado tamb? de "falso-escargot. Tamb? por apresentar gosto diferente e n? ter tanta demanda os produtores n? os utilizaram, jogando-os fora de qualquer jeito no lixo, rios e esgoto. Possui uma concha em forma de cone que pode ser marrom ou com faixas de colora?es que variam entre o castanho at?os arroxeados, podem chegar a medir 20 cm. Seu corpo ?cinza escuro e na totalidade pode pesar at?500gr. Esse animal possui uma velocidade de reprodu?o incr?el. Ele ?capaz de colocar cerca de 600 ovos por ano, ?assexuado.

Pode transmitir dois tipos de vermes prejudiciais ?sa?e humana: Angiostrongylus costaricensis: Causador da doen? angiostrongel?se abdominal que se apresenta com dores abdominais, febre prolongada, falta de apetite e v?itos. Esta doen? provoca perfura?o intestinal, hemorragia abdominal e infec?es que podem levar ?morte. Angiostrongylus cantonesis: Causador da doen? angiostrongil?se meningoencef?ica que ?um tipo de meningite que se apresenta com fortes e constantes dores de cabe? e rigidez na nuca. Esta doen? provoca cegueira, paralisia, dist?bios no sistema nervoso e inflama?o das meninges, e que tamb? pode provocar a morte.

A infec?o humana pode ocorrer atrav? do toque direto, o que ocorre principalmente por crian?s, pois se levarem o local tocado pelo molusco at?a boca essa pode contrair estes vermes transmissores das doen?s, ou ent? pela ingest? de hortali?s contaminadas com as larvas do verme, presentes no muco deixado pelo molusco ao se movimentar.

Al? do perigo para a sa?e humana, este caramujo ?considerado uma praga agr?ola, que pode destruir hortas, jardins e planta?es de subsist?cia. O voraz Achatina fulica devora tudo que encontra pela frente, pois se alimenta de cerca de 500 tipos de plantas. Consome desde papel at?tinta de parede. Al? disso, tem alto potencial invasor, uma vez que se prolifera de forma alt?sima e n? encontra no Brasil predadores naturais, sendo por isso, considerada uma das cem piores esp?ies da Lista na Uni? para Conserva?o da Natureza (UICN).
H?diversas iniciativas de munic?ios em todo o pa? para acabar com a praga dos caramujos-africanos, algumas inclusive com o apoio da IBAMA e outros ?g?s estaduais de prote?o ao meio ambiente, que podem servir de base para a elabora?o do presente estudo.

NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sess?s, em 14 de Dezembro de 2009.

VALDEMIR JOS?SONDA
Vereador